



انجمن علمی پرستاری ایران

آموزش پرستاری

دوره چهارم شماره ۱ (پیاپی ۱۱) بهار ۱۳۹۴ - شماره استاندارد بین المللی: ۲۳۲۲-۳۸۱۲

- مقایسه تأثیر دو روش آموزش چهره به چهره و کتابچه آموزشی بر خودکارآمدی تنفسی مبتلایان به بیماری مزمن انسدادی ریه
..... ۱ مراجعته کننده به بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- ۲ ماشالله اعتمادی سنتدجی - علیرضا قهری سرابی - حمیرا بنکدار - علیرضا اکبرزاده باغیان - همایون بنادرخshan - سعید قاسمی
- تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی ۸ امیر واحدیان عظیمی - فاطمه الحانی - کیوان گهری مقدم - سید جلال مدنی - علی نادری - محمد رضا حاجی اسماعیلی
- بررسی ارتباط میزان توانمندی با دانش مرتبط به بیماری و شاخص‌های کنترل متابولیک در بیماران دیابتی نوع ۲ ۲۳ حسین ابراهیمی - مهدی صادقی - رسول اشرفی
- تأثیر آموزش بر دانش، نکرش و عملکرد از دیدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه تروما در زمینه کاربرد مهارکننده‌های فیزیکی ۳۱ حکیمه حسین رضایی - عصمت نوحی - سیده صفری طاهر هریکنی
- تجرب دانشجویان پرستاری از تدریس استادی در دروس تئوری: یک مطالعه کیفی ۴۹ زیب همتی - فربیبا حقانی - داود کیانی
- بررسی اثربخشی یادگیری تلفیقی بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ۶۰ بهار حاج‌رضایی - حسن روشنی علی‌بنه‌سی - محمد شاهعلی زاده - مریم زینالی - مهدی بدی
- اثربخشی آموزش شناختی - رفتاری گروهی بر شاخص‌های فیزیولوژیکی استرس و مهارت‌های ارتباطی کارکنان بیمارستان ۷۲ حجت پیروزی - علی فتحی‌آشتیانی - محسن شکوهی‌یکتا
- تأثیر آموزش مثبت‌اندیشی بر سخت‌رویی، تاب‌آوری و فرسودگی شغلی زنان پرستار ۷۴ مصصومه مهرآفرید - مسعود خاکپور - محمود جاجرمی - ابراهیم علیزاده موسوی

به نام خداوند جان و خرد
محله آموزش پرستاری
فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران
دوره چهارم - شماره ۱ (پیاپی ۱۱) - بهار ۱۳۹۴

• صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران

• مدیر مسؤول: دکتر فاطمه الحانی

• سردبیر: دکتر عباس عبادی

• مدیر اجرایی: دکتر آذر طل

• شماره پروانه انتشار وزارت ارشاد اسلامی: ۹۴/۴۸۲۳ ۹۱/۲/۲۰

• شماره استاندارد بین المللی: ۲۳۲۲-۲۳۲۲

• شماره بین المللی نشریه الکترونیکی: e-ISSN ۲۳۲۲-۴۴۲۸

• **شورای نویسنده‌گان** (به ترتیب حروف الفبا):

- دکtor محمد اسماعیل پور بندهنی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی گیلان

- دکtor فاطمه الحانی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

- دکtor منیر انوشه، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

- دکtor زهره پارسا یکتا، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکtor حمید پیرروی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- دکtor محمدعلی چرافی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکtor محمدعلی حسینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

- دکtor سیده فاطمه حق دوست اسکویی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- دکtor محمدرضا حیدری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد

- دکtor ناهید دهقان پیری، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکtor ناهید رزه، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد

- دکtor سادات سیدباقر ملاح، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

- دکtor نعیمه سیدقطامی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- دکtor آذر طل، دکترای اموزش پهنشاشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکtor عباس عبادی، دانشیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

- دکtor عباس عباسزاده، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- دکtor شهرزاد غیاثوندیان، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکtor علی فخرمودی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سمنان

- دکtor مسعود فلاخی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

- دکtor انشویرونان کاظم‌نژاد، استاد گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس

- دکtor عیسی محمدی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

- دکtor ندا مهرداد، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

- دکtor حسن ناوی پور، استادیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

- دکtor علیرضا یکیخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکtor مجتبی ویس مرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکtor مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد

- دکtor فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

• **ویراستار انگلیسی: علیرضا قریب**

• **ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی**

• **حروفچینی و صفحه‌آرایی: فرشته حیدری**

• **طراح جلد: اصغر سورانی**

• **ناشر: انجمن علمی پرستاری ایران**

• **نشانی: تهران - میدان توحید - دانشکده پرستاری و مامایی تهران**

• **کد پستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۷۱، صندوق پستی: ۶۶۵۹۲۵۳۵، تلفن و نمابر: ۰۹۵۳۹۸۱۴۱۹**

e-mail: info@jne.ir , **Website:** http://jne.ir

بررسی ارتباط میزان توانمندی با دانش مرتبط به بیماری و شاخص‌های کنترل متابولیک در بیماران دیابتی نوع ۲

حسین ابراهیمی^۱، مهدی صادقی^۲، رسول اشرفی^۳

چکیده

مقدمه: با توجه به شرایط مزمن بیماری دیابت و تأثیر گسترده آن بر جنبه‌های مختلف زندگی، تغییر رویکرد سنتی به توانمندسازی در آموزش و مراقبت بیماران دیابتی می‌تواند با ایجاد بستر مناسب زمینه‌ساز بهبود خودمراقبتی و وضعیت بالینی در بیماران دیابتی باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان توانمندی با دانش مرتبط با بیماری و شاخص‌های کنترل متابولیک در بیماران دیابتی نوع ۲ صورت پذیرفت.

روشن: این مطالعه توصیفی- مقطعی برروی ۱۵۶ بیمار مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سنجش دانش، پرسشنامه سنجش توانمندی (DES-28) و چک لیست ثبت آزمایشات (هموگلوبین A1C، قندخون ناشتا و غیرناشتا، کلسترول، تری‌گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی بالا و چگالی پایین) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و کای مجذور استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران مورد مطالعه $۴۸/۱۱ \pm ۶/۱۸$ و اکثر آن‌ها زن $۵۶/۸\%$ بودند. بین میانگین نمره توانمندی و نمره دانش بیماران ارتباط معنادار مثبت وجود داشت ($p=0/01$). همچنین ارتباط آماری معنادار بین شاخص‌های هموگلوبین A1C، قندخون ناشتا و غیرناشتا، کلسترول، تری‌گلیسرید و HDL با توانمندی وجود داشت ولی با LDL ارتباط معنادار نبود و بیماران با توانمندی بالاتر از مقادیر مطلوب‌تر این شاخص‌ها برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش مبنی بر همراهی ارتقاء سطح دانش با افزایش توانمندی و بهبود شاخص‌های بالینی در بیماران دیابتی، به نظر می‌رسد از طریق آموزش‌های مستمر و افزایش سطح دانش و توانمندی بیماران، می‌توان به پیامدهای مطلوب‌تری از زندگی در این بیماران دست یافت.

کلید واژه‌ها: دیابت نوع ۲، توانمندی، دانش، کنترل متابولیک

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۶/۸

۱ - استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهروд، دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود، شاهرود، ایران

۲ - کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران (نویسنده مسؤول)

پست الکترونیکی: mahdisadeghi@shmu.ac.ir

۳ - کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

مقدمه

دیابت یکی از مشکلات عمدۀ بهداشت عمومی در جهان معاصر است (۱ و ۲). طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده تا سال ۲۰۲۵ نظام‌های ارایه‌دهنده مراقبت با ۳۰۰ میلیون دیابتی در جهان رو به رو خواهد بود (۳) و تا سال ۲۰۳۰، تعداد مبتلایان به دیابت در سرتاسر جهان به ۳۶۶ میلیون نفر خواهد رسید (۴). مطابق گزارش سازمان جهانی بهداشت، شیوع دیابت در ایران بیش از ۸٪ است و ایران از جمله کشورهایی است که در آن دیابت عامل بیش از ۲۰٪ از مرگ و میرها می‌باشد (۴).

دیابت به عنوان یک مشکل بهداشتی، کیفیت زندگی بیماران را تهدید کرده و منجر به عوارض حاد و مزمن می‌گردد. همچنین دیابت یک علت مهم ناتوانی و مرگ و میر در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود (۵). یکی از بهترین روش‌های دستیابی به کنترل موفق و مناسب دیابت، توانمندسازی بیماران مبتلا به این بیماری است (۶). توانمندی یک احساس ذهنی است که یکی از ارکان اصلی ارتقای بهداشت عمومی جامعه می‌باشد (۷) و یک راهبرد عملکردی در ارتقای سلامت محسوب می‌شود (۸).

از نظر Lindsay و Craig توانمندسازی فرآیندی است که از طریق آن افراد بر وضعیت خود تسلط پیدا می‌کنند (۹). توانمندسازی بیمار در واقع فرآیند اطلاع‌رسانی به بیماران و ارایه این اطلاعات با ابزارهای لازم و ایجاد استقلال در بیماران جهت ایفای نقش فعال در تصمیم‌گیری‌هایشان می‌باشد (۱۰). در رویکرد توانمندسازی بیمار و متخصص دست در دست هم برای کنترل و کاهش پیامدهای بیماری برنامه‌ریزی و اقدام می‌نمایند. در این رویکرد همه پتانسیل بیمار برای سازگاری با بیماری و تغییر روند آن و گسترش مسؤولیت‌فردی در برخورد با بیماری مورد توجه و تأکید است و این امر موجب می‌شود که فرآیند درمان نه امری مقطوعی بلکه به پدیده‌ای مستمر تبدیل شود (۱۱). توانمندسازی به عنوان یک شاخص مهم در تطبیق با بیماری در افراد دیابتی مطرح است که به بیماران برای کشف و استفاده از حداکثر توانایی خود به منظور مدیریت بیماری کمک می‌نماید (۱۲).

نتیجه تحقیقات مختلف نشان داده است، افراد دیابتی توانمند، کیفیت زندگی مطلوب‌تری را تجربه کرده

روش مطالعه

این مطالعه تحلیلی- مقطعی را بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تشکیل داده و معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: سن بالاتر از ۱۸ سال، تشخیص قطعی بیماری دیابت نوع دو حداقل به مدت یک سال و تمایل بیمار برای شرکت در پژوهش. مرکز دیابت بیمارستان امام حسین (۱) شهرستان شاهرود به علت سهولت دسترسی به بیماران، به عنوان محیط پژوهش انتخاب شد. ابزار به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش دانش، پرسشنامه توانمندی و چک لیست ثبت شاخص‌های کنترل متابولیک بود.

پرسشنامه سنجش دانش مرتبط با بیماری شامل ۲۴ سؤال چهار گزینه‌ای در ارتباط با مسائل مهم بیماری دیابت تهیه و تنظیم و نمره آن از ۰ تا ۲۴ منظور شده و روابی آن به صورت روابی محتوا و پایایی ابزار به شکل بازآزمایی (۰/۹۸=۱۷) در مطالعه صادقی و همکاران انجام شده بود (۱۷). همچنین پرسشنامه سنجش توانمندی DES-28 (توسط مرکز آموزش و پژوهش دانشگاه

SPSS v.19 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری کای مجذور و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها

تعداد بیماران شرکت‌کننده در مطالعه حاضر ۱۵۶ نفر بود که توزیع فراوانی و مرتبط با بیماری واحدهای تحت پژوهش در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. براساس نتایج میانگین نمره توانمندی واحدهای پژوهش $16/84 \pm 5/6$ و میانگین نمره دانش آن‌ها $12/74 \pm 2/31$ گزارش شد. جدول شماره ۲ نشان می‌دهد که همبستگی معنادار و مثبت در نمره دانش مرتبط با بیماری با نمره توانمندی مشاهده گردید و بیماران با توانمندی بالاتر از نمره دانش بالاتری نیز برخوردار بودند. همچنین میزان شاخص‌های آزمایشگاهی با توانمندی در شاخص‌های هموگلوبین A1C، قندخون ناشتا، قندخون غیرناشتا، کلسترول، تری‌گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی بالا ارتباط معنادار گزارش گردید. همچنین میزان توانمندی با مقادیر تمامی شاخص‌ها به جز HDL همبستگی منفی داشت (جدول شماره ۳).

میشیگان طراحی و استاندارد شده است و پایابی آن ۰/۹۷ به دست آمده بود (۱۸/۱۹). همچنین مطالعات طل و همکاران نیز پایابی بالای ابزار فوق برروی بیماران دیابتی ایران را نشان داده‌اند (۱۲). پرسشنامه فوق شامل ۵۶ سؤال در سه حیطه (مدیریت روانی دیابت، ارزیابی نارضایتی و آمادگی برای تغییر و تعیین اهداف مرتبط با دیابت و دستیابی به آن‌ها) طراحی شده و برای ارزش‌گذاری آن از طبقه‌بندی لیکرت پنج طبقه‌ای از کاملاً موافق (۵) تا کاملاً مخالف (۱) استفاده شد. محدوده نمرات از ۰ تا ۱۴۰ بوده و نمره بالاتر به معنی توانمندی بیشتر در این بیماران می‌باشد. همچنین از چک لیست جهت ثبت آزمایشات بیماران تحت پژوهش استفاده شد که در این راستا علاوه بر شاخص هموگلوبین A1C که به عنوان مهم‌ترین معیار متابولیکی بیماران دیابتی مطرح است (۲۰)، آزمایشات قندخون ناشتا و غیرناشتا، کلسترول، تری‌گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی بالا و چگالی پایین نیز ثبت و بررسی شدند. به منظور یکسان بودن آزمایش تمام نمونه‌ها، آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (۴) به عنوان محل انجام این کار جهت تمام بیماران انتخاب گردید.

قبل از شروع کار اهداف پژوهش برای کلیه بیماران توضیح و از آن‌ها جهت شرکت در مطالعه رضایت‌نامه کتبی اخذ شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار

جدول ۱ - مشخصات فردی و مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

تعداد/درصد	ویژگی مورد بررسی	
$48/116 \pm 18$	میانگین سن (سال)	
$7/36 \pm 2/35$	زمان تشخیص بیماری	
(%) ۳۷/۲ (۵۸) ۶۲/۸۹۸	مرد زن	جنس
$27/33 \pm 4/38$ $26/12 \pm 4/23$	مرد زن	شاخص توده بدنی
(%) ۷۹/۵ (۱۲۴) ۲۰/۵ (۳۲)	متاهل همسر فوت شده	وضعیت تأهل
(%) ۶۴/۱ (۱۰۰) ۲۴/۴ (۳۸) ۱۱/۶ (۱۸)	ابتدایی و نهضت راهنمایی دپلم و بالاتر	سطح تحصیلات

جدول ۲ - ارتباط توانمندی با نمره دانش در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

ضریب همبستگی پیرسون / <i>p</i> -value	نمره دانش (Mean \pm SD)	متغیر
$r=+0/46$ $p=+0/1$	$6/31 \pm 12/74$	توانمندی

جدول ۳- همبستگی شاخص‌های آزمایشگاهی با توانمندی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

r	توانمندی (<i>p</i> -value)	متغیر	شاخص‌های کنترل متابولیک
$r=-0.54$	<0.001	8.06 ± 1.69	هموگلوبینC (%)
$r=-0.54$	<0.001	$168/41 \pm 32/11$	قندخون ناشتا dl/g
$r=-0.54$	-0.01	$265/88 \pm 50/37$	قندخون غیر ناشتا dl/g
$r=-0.54$	-0.05	$173/86 \pm 43/11$	کلسیتول dl/g
$r=-0.54$	-0.04	$195/98 \pm 64/52$	تری‌گلیسرید mg/dl
$r=-0.54$	-0.21	$175/33 \pm 64/47$	لیپوپروتئین با پچگالی پائین mg/dl
$r=0.54$	-0.01	$45/89 \pm 9/91$	لیپوپروتئین با چگالی بالا mg/dl

بحث

A1C در بیماران دیابتی با توانمندی ارتباط معنادار داشت. در مطالعه Shiu و همکاران ارتباط خطی بین توانمندسازی بیماران دیابتی و بهبود وضعیت کنترل متابولیک وجود نداشت (۱۵) اما در تحقیق طل و همکاران ارتباط خطی مستقیم بین این دو متغیر گزارش شد (۳۷). در همین راستا در مطالعه شجاعی‌زاده و همکاران نیز با افزایش توانمندی بیماران دیابتی میزان هموگلوبین A1C آن‌ها کاهش می‌یافتد (۲۸). در همین راستا صادقی و همکاران در مطالعه خود، تأثیر مثبت برنامه‌های مبتنی بر الگوی توانمندسازی بر وضعیت کنترل متابولیکی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ را به خوبی نشان داده‌اند (۱۷). همچنین در مطالعه حیدری و همکاران تأثیر مثبت اجرای برنامه توانمندسازی در بهبود کیفیت زندگی و کنترل متابولیکی در نوجوانان مبتلا به دیابت مشاهده شد (۲۹). مطالعه Pibernik-Okanovic و همکاران نیز بهبود وضعیت کنترل متابولیکی را با اجرای مداخلات روانی مبتنی بر توانمندسازی گزارش کردند (۳۰). در تحقیق Goldhaber-Fiebert و همکاران نیز نشان داده شد افزایش دانش بیماران مبتلا به دیابت بعد از برگزاری ۱۱ کلاس آموزش هفتگی در مورد تنفسیه و ورزش باعث بهبود عملکرد این بیماران شده و پیامدهایی همچون کاهش وزن و کنترل بهتر قندخون را در آن‌ها به همراه داشت (۳۱) که مجموع نتایج تحقیقات فوق نشان می‌دهد با اجرای برنامه‌های توانمندی در بیماران دیابتی، پیامدهای مطلوب‌تری از شاخص‌های بالینی را می‌توان در آن‌ها شاهد بود.

نتایج مطالعه حاضر مشخص کرد بیماران با توانمندی بالاتر از دانش بیشتری نسبت به بیماری خود برخوردارند و شاخص‌های کنترل متابولیک آن‌ها از مقادیر

نتایج مطالعه نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین توانمندی و نمره دانش مرتبط با بیماری دیابت وجود داشت به این معنی که بیماران با توانمندی بیشتر، به طور معناداری از دانش بالاتری نسبت به مسایل بیماری دیابت برخوردار بودند. Minet و همکاران در تحقیق خود گزارش کردند بیماران دیابتی زمانی توانمند می‌شوند که اطلاعات لازم در مورد بیماری خود را به منظور اتخاذ تصمیم آگاهانه کسب نمایند، کنترل مناسبی بر خود، شرایط مناسب برای اجرای تصمیم و تجارت لازم برای ارزشیابی سودمندی این تصمیمات را داشته باشند (۲۱). دانش بیماران درباره بیماری و کنترل آن اهمیت به سزاوی دارد و بر کنترل بیماری اثرگذار است (۲۲). وجود دانش، یکی از اجزاء کلیدی توانمندسازی است که در راستای بهبود توانمندسازی بیماران، افزایش مشارکت‌پذیری بیمار و تعامل آن‌ها ضروری است (۲۳). بر این اساس شواهد علمی نشان داده است زمانی که بیمار در گیر فرآیند درمان بیماری خود می‌گردد به نسبت زمانی که در امر درمان خود غیرفعال است، نتایج بهتری به دست می‌آورد (۲۴). مطالعه Mosnier-Pudar و همکاران نشان داد که بالا بردن سطح دانش بیماران دیابتی از طریق آموزش به آن‌ها باعث می‌شود که بیماران با کسب دانش بیشتر در مورد شدت بیماری خود، به توصیه‌های ارایه شده برای کنترل و مدیریت بیماری توجه بیشتری نموده و فعال‌تر در مدیریت بیماری خود در گیر می‌شوند (۲۵). همچنین نتیجه مطالعه طل و همکاران نشان داد بیماران با سطح آگاهی بالاتر و دارای درک بهتر از بیماری، رفتارهای خودمدیریتی را بیشتر اتخاذ نموده و در نتیجه آن کنترل دیابت بهتری داشتند (۲۶).

در پژوهش حاضر نشان داده شد، مقادیر اکثر شاخص‌های کنترل متابولیک از جمله میزان هموگلوبین

از محدودیت‌های مطالعه حاضر می‌توان به حجم نمونه محدود و احتمال سوگیری به دلیل این که تنها بیماران ارجاعی به مرکز دیابت تحت مطالعه قرار گرفتند، اشاره نمود که انجام تحقیقات گسترش‌تر بر روی جمعیت‌های مختلف و با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد می‌گردد.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد توانمند نمودن بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن از جمله دیابت از طریق گنجاندن اقدامات آموزشی مبتنی بر رویکرد توانمندسازی، در برنامه‌های مراقبتی از طریق افزایش آگاهی و بهبود پیامدهای بالینی و همچنین فرآگیر نمودن احساس مسؤولیت‌پذیری بیماران در مورد بیماری خود، به طور مؤثری باعث بهبود وضعیت این بیماران خواهد شد.

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر بخشی از طرح مصوب به شماره ۱۹۰۱ معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهروod بود که بدین‌وسیله محققین حمایت مالی و معنوی این معاونت و همچنین همکاری صمیمانه پرستاران محترم شاغل در واحد دیابت بیمارستان امام حسین (ع) و بیمارانی که بدون همکاریشان ادامه این فعالیت علمی امکان‌پذیر نبود را ارج می‌نهند.

مطلوب‌تری برخوردار است. تغییر رویکرد سنتی به توانمندسازی در آموزش و مراقبت بیماران دیابتی می‌تواند با ایجاد بستر مناسب، زمینه‌ساز بهبود خودمراقبتی و وضعیت سلامتی در بیماران دیابتی باشد (۱۴).

توانمندسازی بیماران مبتلا به دیابت به عنوان یک برنامه مؤثر در راستای تغییر رفتار در مراقبت دیابت به شمار می‌آید (۳۲). در این راستا نتیجه مطالعه طلل و همکاران نیز مشخص کرد مداخلات آموزشی مبتنی بر میزان توانمندسازی بیماران دیابتی، پتانسیل ارتقاء رفقارهای خودمدیریتی در کنترل مؤثر بیماری را دارا هستند (۱۲) و توجه به مفاهیمی مانند توانمندسازی بیمار در بهبود نتایج مداخلات در این بیماران اجتناب‌ناپذیر است (۲۸). این اقدام از طریق آماده‌سازی، اطلاع‌رسانی با استفاده از منابع چندرسانه‌ای و تکنولوژی اطلاعات و ارتقا در برنامه‌های خودمدیریتی دیابت میسر می‌گردد (۲۴). از طرف دیگر با ایجاد ارتباط مناسب و هماهنگ، یک مشارکت راضی‌کننده در طرفین ایجاد می‌شود که نتیجه آن بهبود شاخص‌های کنترل دیابت، افزایش خودکارآمدی و ارتقای سطح رضایت‌مندی دو جانبه می‌باشد (۱۱). بنابراین تغییر رویکرد برنامه‌های مراقبتی به سمت توانمندسازی و افزایش درگیر نمودن و مشارکت بیماران در مدیریت بیماری خود، می‌تواند با بهبود شاخص‌های بالینی و وضعیت سلامتی همراه باشد.

منابع

- 1 - Spinaci S, Currat L, Shetty P, Crowell V, Kehler J. Tough Choices: Investing in health for development: Experiences from national follow-up to commission on macroeconomics and health, WHO Report. 2006.
- 2 - Silva AM, Vargas AMD, Abreu MHNGd. Periodontitis in individuals with diabetes treated in the public health system of Belo Horizonte, Brazil. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2010; 13(1): 118-25.
- 3 - Larijani B. First Conference artery and diabetes: Current methods of treatment and prevention. Monthly Journal of Medical Engineering (Information, news, education and research). 2007; 81(1).
- 4 - World health organization. Diabetes action now: an initiative of the world health organization and international diabetes federation. [web page] 2004 [cited 2010 Aug 15]; Online material available at: www.who.int/diabetes/actionnow/en/DANbooklet.pdf.

- 5 - Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson G. Harrison's Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2005.
- 6 - Abdoli S, Ashktorab T, Ahmadi F, Parvizi S. Barriers to and Facilitators of Empowerment in People with Diabetes. *Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism*. 2009; 10(5): 455-64. (Persian)
- 7 - Auld M, Hatcher M. Environmental health promotion: advancing the science and practice. *Health Promot Pract*. 2010; 11(3): 301-2.
- 8 - Naidoo J, Wills J. Health promotion functions for practice. London Toronto. Second Ed. 2000. P. 98-9.
- 9 - Craig P, Lindsay G. Nursing for public health: population-based care. New York: Elsevier Health Sciences; 2000. P. 143-4.
- 10 - Peperstraten A, al e. The effect of a multifaceted empowerment strategy on decision making about the number of embryos transferred in in vitro fertilisation: randomised controlled trial. *BMJ*. 2010(341): C 2501.
- 11 - Tol A, Alhani F, Shojaezadeh D, Sharifirad G. Empowerment Approach to Promote Quality of Life and Self-Management among Type 2 Diabetic Patients. *Health System Research*. 2011; 7(2): 157-68. (Persian)
- 12 - Tol, A, G. Sharifirad, Pourreza, AG. Rahimi, A. Shojaeezadeh, D. Mohajeritehrani, MR. et al. "Development of a Valid and Reliable Diabetes Empowerment Scale: An Iranian Version." *Iranian Red Crescent Medical Journal*. 2012; 14(5): 305.
- 13 - Robert K. Patient empowerment in the united state: a critical commentary. *Health Expect*. 1999; 2: 82-92.
- 14 - Sadeghi M, Ebrahimi H, Bazghaleh M. Relationship between empowerment with dimensions of quality of life and some related factors in patients with type 2 diabetes in the Shahroud city, 2013. *Journal of Clinical Nursing and Midwifery*. [Orginal Article]. 2015; 3(4): 29-38. (Persian)
- 15 - Shiu A, Martin C, Thompson D, Wong R. Empowerment and metabolic control in Patients with diabetes mellitus. *Clin Eff Nurs*. 2005; 9(1-2): 88-91.
- 16 - Koch T, Kralik D, Sonnack D. Women living with type II diabetes: the intrusion of illness. *J Clin Nurs*. 1999; 8: 712-22.
- 17 - Sadeghi M, Pedram Razi S, Nikbakht Nasrabadi A, Ebrahimi H, Kazemnejad A. Comparison of the impact of education based on the empowerment model and family-center empowerrment model on knowledge and metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus. *Journal of Nursing Education*. 2013; 2(3): 18-27. (Persian)
- 18 - Diabetes Empowerment Scale (DES-28): Michigan Diabetes Research and Training Center. Available from: URL: <http://www.med.umich.edu/mdrtc/survey/htm>.
- 19 - Liu M, Tai Y, Hung W, Hsieh M, Wang R. Relationships between emotional distress, empowerment perception and self-care behavior and quality of life in patients with type 2 diabetes. *Hu li za zhi The journal of nursing*. 2010; 57(2): 49-60.

- 20 - ADA. American Diabetes Association (ADA), Standards of Medical Care in Diabetes. *Diabetes Care.* 2012;35, Supplement 1:S11-63.
- 21 - Minet L, Møller S, Vach W, Wagner L, Henriksen JE. Mediating the effect of self-care management intervention in type 2 diabetes: a meta-analysis of 47 randomised controlled trials. *Patient education and counseling.* 2010; 80(1): 29-41.
- 22 - Aghamolaei T, Sobhani A, yousefi H, Asadi-Noghabi F. Behavior and metabolic control of patients covered by diabetes clinic of Bandar Abbas. Hormozgan University of Medical Sciences. 2003; 7(3): 101-15. (Persian)
- 23 - Sigurdardottir A, Jonsdottir H. Empowerment in diabetes care: towards measuring empowerment. *Scand J Caring Sci.* 2008; 22: 284-91.
- 24 - Funnell MM, Anderson RM, Arnold MS, Barr PA, Donnelly M, Johnson PD, et al. Empowerment: an idea whose time has come in diabetes education. *The Diabetes Educator.* 1991; 17(1): 37-41.
- 25 - Mosnier-Pudar H, Hochberg G, Eschwege E, Virally M, Halimi S, Guillausseau P, et al. How do patients with type 2 diabetes perceive their disease? Insights from the French DIABASIS survey. *Diabetes Metab.* 2009; 35(3): 220-7.
- 26 - Tol A, Sharifi Rad G, Eslami AA, Alhani F, Mohajeri Tehrani MR, Shojaeezadeh D. Factors influencing self-management behavior in type-2 diabetes patients: A strategy proposed to be adopted when planning theory/model based interventions. *Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. [Research].* 2012; 9(4): 21-32. (Persian)
- 27 - Tol A, Shojaeezadeh D, Sharifirad G, Alhani F, Mohajeri Tehrani M. Determination of empowerment score in type 2 diabetes patients and its related factors. *J Pak Med Assoc.* 2012; 62: 16.
- 28 - Shojaeezadeh D, Sharifirad G, Tol A, Mohajeri Tehrani M, Alhani F. Effect of empowerment model on distress and diabetes control in patients with type 2 diabetes. 2 *Journal of Nursing Education. [Quantitative-Research].* 2012; 1(1): 38-47. (Persian)
- 29 - Heidari M. The effect of empowerment model on quality of life of Diabetic adolescents. Master's thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 2006. (Persian)
- 30 - Pibernik-Okanovic M, Prasek M, Poljicanin-Filipovic T, Pavlic-Renar I, Metelko Z. Effects of an empowerment-based psychosocial intervention on quality of life and metabolic control in type 2 diabetic patients. *Patient education and counseling.* 2004; 52(2): 193-9.
- 31 - Goldhaber-Fiebert J, Goldhaber-Fiebert S, Tristán M, al e. Randomized controlled community-based nutrition and exercise intervention improves glycemia and cardiovascular risk factors in type 2 diabetic patients in rural Costa rica. *Diabetes Care.* 2003; 26(10): 24-9.
- 32 - Shojaeezadeh D, Tol A, Sharifirad G, Mohajeri Tehrani M, Alhani F. Evaluation of educational program based on empowering model on promotion of self efficacy and its relationship to diabetes control in patients with type 2 diabetes. *Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders. [Research].* 2012; 11(5): 474-82. (Persian)

The relationship between empowerment with knowledge related to disease and indicators of metabolic control in type 2 diabetic patients

Ebrahimi¹ H (Ph.D) - Sadeghi² M (MSc.) - Ashrafi³ R (MSc.).

Abstract

Introduction: Due to the chronic condition of diabetes and widespread impact on various aspects of life, changing the traditional approach to empowering education and care patients with diabetes may improve levels of self-care and clinical status of them. The purpose of this study was the finding the relationship between empowerment with knowledge related to disease and indicators of metabolic controls in type 2 diabetic patients.

Method: This analytical-descriptive study was conducted on 156 patients with type 2 diabetes in 2013. The data collection tool was a questionnaire to assess knowledge, empowerment assessment questionnaire (DES-28) and test record forms (hemoglobin A1C, fasting and non-fasting blood glucose, cholesterol, triglycerides and high-density and low-density lipoprotein). Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient.

Results: Mean age of the patients was 48.11 ± 6.18 and most of them were female (62.8%). There was a significant relationship between the mean score for empowerment and knowledge of patients. Also a significant relationship was found between hemoglobin A1C, fasting and non-fasting blood glucose, cholesterol, triglycerides and HDL with empowerment. But, there was not a significant relationship with LDL and patients with higher empowerment.

Conclusion: Continuous training and increasing the knowledge and Empowerment of patients can may result in a favorable outcome of life in these patients.

Key words: Type 2 diabetes, empowerment, knowledge, metabolic control

Received: 30 August 2014

Accepted: 21 February 2015

1 - Ph.D, School of Nursing and Midwifery, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood, Iran
 2 - Corresponding author: MSc., School of Nursing and Midwifery, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood, Iran

e-mail: mahdisadeghi@shmu.ac.ir

3 - MSc., School of Nursing and Midwifery, Shahrood University of Medical Sciences, Shahrood, Iran



Iranian Nursing
Scientific Association

Journal of Nursing Education

Vol. 4 No. 1 (Serial 11) Spring 2015 ISSN: 3812 - 2322

- *Comparison of impact of face to face and educational booklet methods on respiratory self efficacy of patients with chronic obstructive pulmonary disease attending to selected hospitals of Shahid Beheshti university of medical sciences in Tehran.....* 7
Etemadi Sanandaji M (MSc.) - Ghahri Sarabi A (MSc.) - Bonakdar H (MSc.) - Akbarzade Baghban A (Ph.D) - Banaderakhshan H (MSc.) - Ghasemi S (MSc.).
- *Effect of family - centered empowerment model on the quality of life in patients with myocardial infarction: A clinical trial study.....* 22
Vahedian-azimi A (Ph.D) - Alhani F (Ph.D) - Goharimogaddam K (MD) - Madani SJ (MD) - Naderi A (MSc.) - Hajiesmaeili M (MD).
- *The relationship between empowerment with knowledge related to disease and indicators of metabolic control in type 2 diabetic patients.....* 30
Ebrahimi H (Ph.D) - Sadeghi M (MSc.) - Ashrafi R (MSc.).
- *The effect of education on trauma critical care nurses attitudes towards and knowledge and practices from the viewpoint of their about application of physical restraint.....* 38
Hooseinrezaee H (MSc.) - Nouhi E (Ph.D) - Taher harikandee S (MSc.).
- *Nursing students' perceptions of teaching by teachers in theoretical courses: A qualitative study.....* 48
Hemati Z (MSc.) - Haghani F (Ph.D) - Kiani D (B.Sc.).
- *Effectiveness of blended learning on critical thinking skills of nursing students.....* 59
Hajrezayi B (MSc.) - Roshani alibinas H (MSc.) - Shahalizade M (MSc.) - Zeynali M (MSc.) - Badali M (MSc.).
- *Effectiveness of group cognitive-behavioral training on physiological indicators and communication skills in the hospital staffs* 71
Pirzadi H (MSc.) - Fathi-Ashtiani A (Ph.D) - Shokoohi-Yekta M (Ph.D).
- *Effectiveness of positive thinking training on hardiness & resilience and Job burnout in women nurses.....* 83
Mehafarid M (MSc.) - Khakpour M (MSc.) - Jajarmi M (Ph.D) - Alizadeh mousavi A (Ph.D).